



Обработка почвы против борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Одним из способов уничтожения борщевика Сосновского является обработка почвы.

На территории сельскохозяйственных предприятий и муниципальных образований обработку почвы применяют на тех участках, где можно использовать сельскохозяйственную технику. Целесообразно проводить глубокую вспашку. В течение вегетационного сезона вспашка проводится несколько раз. Первая вспашка должна быть проведена вскоре после наступления момента выезда в поле.

Также можно проводить подрезку корней борщевика, используя плоскорезы. Глубина обработки – 5 – 10 см. Важно срезать точку роста борщевика, которая находится на глубине 3-10 см в зависимости от типа почвы и климатических условий региона. На небольших территориях, например, садовых участках бороться с борщевиком можно обычной лопатой. Также можно использовать прополку и просто удалять мелкие всходы. После отрастания растений проводится вторая обработка. Если применять только этот метод, то для полного уничтожения всех растений борщевика обработку почвы нужно будет проводить в течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей семенами) – от 2-3 до 5-7 лет.

Еще один из методов борьбы с борщевиком – это метод вспашки и дискования. Этот способ также подразумевает многократный выход на поле: первый – в мае, последующие – в течение всего лета до сентября. Поэтому он возможен лишь на участках, оставленных под паром. Суть метода заключается в следующем: в мае производится вспашка участка с последующим дискованием; через каждые 20-30 дней производится дискование участка. Таким образом, удается за сезон избавиться от борщевика Сосновского даже при массивном засорении поля. Отдельные экземпляры могут взойти в сентябре, но они легко удаляются вручную лопатой.

Осенью вспашку на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя, так как это будет способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение борщевиков растянется еще на несколько лет.

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по Архангельской области по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по телефону 8 (8182) 65-33-84, а также в районные отделы.